

## تفشي مرض فيروس ايبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

(٢٨ أبريل ٢٠٢٢)

### الإعلان عن التفشي

- في ٢٢ ابريل ٢٠٢٢ أعلنت السلطات الصحية التابعة لمجلس الأمم الأفريقية تشخيص حالة واحدة مؤكدة لمواطن من جمهورية الكونغو يبلغ من العمر ٣١ عاماً.
- بدأ ظهور الأعراض لديه في ٥ ابريل ٢٠٢٢.
- تم إدخاله إلى العناية المركزة يوم ٢١ ابريل ٢٠٢٢ وتوفي بعد يوم واحد.
- في ٢٥ ابريل تم تشخيص الحالة الثانية لامرأة عمرها ٢٥ سنة من نفس العائلة وتوفيت في نفس اليوم لكن الأعراض بدأت في ١٣ ابريل.
- يتم متابعة المئات من المخالطين المحتملين ولم تسجل حالات جديدة بعد.
- لا يوجد توجيهات محددة من منظمة الصحة العالمية بشأن هذا التفشي بعد.

### أعراض مرض فيروس ايبولا وتطور الحالات

- تبدأ بحمى، إعياء، ألم في العضلات، صداع، التهاب الحلق.
- يتبعها استفراغ، اسهال، طفح جلدي، اعراض قصور وظائف الكلى والكبد، نزيف داخلي وخارجي.
- نسبة الوفيات من مضاعفات المرض ٢٥% إلى ٩٠%.

### الانتشار والتاريخ الوبائي

- الحاضن للفيروس هو بعض الحيوانات البرية وأهمها خفاش الفواكه والشمبانزي والقرد.
- ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان.
- ينتقل بين الناس بشكل مباشر من خلال افرازات الجسم وبشكل غير مباشر من خلال استخدام الأغراض الشخصية الملوثة.
- بدأ اول تفشي عام ١٩٧٦ في جمهورية افريقيا الوسطى.
- من عام ١٩٧٦ تم تسجيل ١٦ تفشي وبائي في بعض الدول الأفريقية.

### التشخيص

- يتم تشخيص الحالات وتأكيدتها بناء على الفحوصات المخبرية وأهمها قياس الأجسام المضادة للفيروس وكذلك فحص PCR.

### العلاج

- علاج تلطيفي للأعراض وأهمها الإرواء.
- تم إجازة دوائين من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عام ٢٠٢٠ Imzab و Ebanga وهي عبارة عن أجسام مضادة للفيروس.

### مكافحة المرض والوقاية منه

- التوعية الصحية حيال طرق انتقال الفيروس.
- لقاح Ervebo وتم إجازته في عام ٢٠٢٢ ويعطى لمن هم أكبر من ١٨ سنة.
- لقاح Zebadeno وتم إجازته عام ٢٠٢٠ ويعطى على جرعتين بينهما ٨ اشهر لمن هم اكبر من سنة.