

رقم المرفق	٥٩	رقم المادة	٨/١٥	رقم الإصدار	٤
عنوان المرفق	نشاط الختان				

ضوابط عملية الختان في المؤسسات الصحية الخاصة

أولاً: الشروط الواجب توفرها في من يقوم بعملية الختان:

- طبيب نائب كحد أدنى (مصنف ومسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) في أحد التخصصات التالية (جراحة عامة - جراحة أطفال - مسالك بولية).

ثانياً: المؤسسات الصحية الخاصة التي يصرح لها بعملية الختان:

- يتم إجراء عملية الختان في المؤسسات الصحية الخاصة التالية: (المستشفيات الخاصة - المجمعات الطبية العامة والمتخصصة - العيادات الخاصة) وذلك في حالة وجود الطبيب المتخصص والمؤهل للقيام بعمليات الختان كما هو موضح في البند أولاً وفق ما يلي:
 - ١- يسمح للمستشفيات الخاصة بإجراء عملية الختان للأطفال ابتداءً من اليوم الأول للولادة.
 - ٢- يسمح بإجراء عملية الختان بالمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والعيادات الخاصة للأطفال من سن شهر وحتى سن ثلاثة شهور.
 - ٣- تجرى عملية الختان للأطفال أكثر من ٦ شهور تحت التخدير العام بالمستشفيات.

- تجرى عملية الختان بغرفة مجهزة (مثل غرفة الضماد) على أن تجهز بالتجهيزات التالية :-

● CIRCUMCISION SET :

- MOSQUITO FORCEPS CURVE - 4 PCS
- MOSQUITO FORCEPS STRAIGHT - 2 PCS
- NEEDLE HOLDER - 1 PC
- ADEDON FORCEPS -1 PC
- TOOTHED / NON - TOOTHED FORCEPS
- SCISSORS (SMALL CURVE)



وزارة الصحة Ministry of Health

- GLOVES
- SUTURE (RAPID ABSORBED 4.0 CUTTING EDGE)
- CAUTERY MACHINE (BIPOLAR)
- IODINE
- GAUZE (SMALL STRIPS)
- LIDOCAINE SPRAY 5% OR EMLA CREAM
- BABY BED (HOLDER) TO RESTRICT THE BANY.

ثالثاً: الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل عملية الختان:

- ١ في حالة وجود أمراض النزيف أو التخثر لدى الطفل أو عائلته أو وجود تشوهات خلقية بالجهاز التناسلي الخارجي أو الجلد المحيط به يجب أن تتم إجراء عملية الختان بواسطة الاستشاري في أحد التخصصات الموضحة في البند أولاً وذلك بعد اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة.
- ٢ يجب ألا يحتوي التخدير الموضعي في حالة استخدامه على مادة الإبينفرين (Epinephrine).

رابعاً: طرق الختان المسموح بها:

تتم عملية الختان باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

- Plastibell method.
 - Free hand surgical procedure without using instruments (bone cutter and gomco clamp are strictly prohibited)
- (الطريقة الجراحية بدون استخدام أجهزة متخصصة مثل قاطع العظم وماسك جومكو)
- يمكن استخدام جهاز الكي الكهربائي الثنائي (Bipolar diathermy) فقط.
 - يحظر تماماً استخدام (Unipolar diathermy).



وزارة الصحة Ministry of Health

خامسا: التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها بعد عملية الختان:

- بعد ساعتين من إجراء عملية الختان يسمح للطفل بمغادرة المكان ويتم تزويد ذويه بالإرشادات والتعليمات التالي:-
- على الأم أن تقوم بتنظيف المنطقة بعناية فائقة وبلطف في كل مرة تقوم فيها بتغيير الحفاض للطفل.
- إذا كان هناك ضمادة مستخدمة لحماية المنطقة، فعلى الأم أيضا أن تقوم بتغيير هذه الضمادة خلال كل تغيير حفاظة للطفل .
- إذا كان هناك جهاز حزام بلاستيكي plastibell ، تركه الجراح بعد عملية الختان مفترضا أنه سوف يسقط تلقائيا بعد عدة أيام ، فعلى الوالدين عرض الطفل على الطبيب بعد اليوم العاشر ، في حالة عدم سقوطه.
- على الأم وضع نوع من الكريمات أو الجيلي (الهلام) لمنع الإصابة بالحساسية والتهيج والعدوى.
- إن وجود بضعة نقاط صغيرة من الدم في حفاظة الطفل هو أمر طبيعي ، ولكن ينصح بالاتصال على الطبيب بدون تأخر اذا كانت كمية الدم كبيرة.
- يجب على الوالدين استشارة الطبيب عند ملاحظتهم أيأ من الاعراض التي تدل على بداية الإصابة بالعدوى المرضية مثل الحمى، احمرار المنطقة او تورم واضح على العضو، او خروج افراز ذي لون اصفر والذي يدل على وجود عدوى مرضية.